

Nugrass 910 F BMR

Ficha Técnica

Sorgo Forrajero

TIPO DE MATERIAL

HÍBRIDO DE SORGO



TIPO DE HÍBRIDO

Fotosensitivo BMR ⁽¹⁾

USO

Pastoreo Directo

CICLO

Largo

DIAS A FLORACIÓN ^(**)

120 - 125

ALTURA (MTS) ^(**)

3,00 - 3,20

MACOLLAJE

Alto

BMR

Presente

DÍAS AL PRIMER PASTOREO

40 - 42

DÍAS AL SEGUNDO PASTOREO

25 - 27

COMPORTAMIENTO SANITARIO

VIRUS MDMV

T ^(*)

DOWNY MILDEW

TA ^(*)

MANEJO

DENSIDAD DE SIEMBRA (KG/HA)

18 - 20

ZONA AGROCLIMÁTICA RECOMENDADA

Todas las Zonas del País

(*) Referencias TA: Tolerancia Alta, TM: Tolerancia Media, T: Tolerante, TB: Tolerancia Baja

(**) Datos obtenidos en Provincia de Santa Fe bajo condiciones potenciales.

(1) El carácter BMR indica un 50 a 60% menos de contenido de lignina en toda la planta, mejorando la digestibilidad y consumo por parte del animal.