

Centeio Forrageiro
TEMPRANO

O único centeio forrageiro do mercado!



CARACTERÍSTICAS

PASTEJO

- Ótima relação folha/colmo;
- Ampla época de semeadura;
- Permite até 5 pastejos;
- Ciclo vegetativo: 100 a 120 dias;
- Entrada para corte: 75 e 115 dias;
- Qualidade e produtividade superior às aveias comuns.

COBERTURA DE SOLO

- Alto volume de massa;
- Sistema radicular vigoroso;
- Melhora a infiltração e retenção de água no solo;
- Excelente supressor de plantas invasoras;
- Resistente às geadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Semeadura em linha: Pastejo 40kg | Cobertura 25kg

Nº de sementes/m linear: Pastejo 29 | Cobertura 18

Semeadura a lanço: 40% mais em sementes

Profundidade de semeadura: 2 cm

Época de semeadura: 2ª quinzena de março até final de julho

Corte ou pastejo: 20 cm

Entrada para pastejo: 20 a 25 cm

Saída do pastejo: 8 a 12 cm

Primeiro corte/pastejo: aprox. 45 dias após emergência

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE CEREAIS DE INVERNO, MÉDIA DOS CORTES. CASTRO/PR


| Espécie | Cultivar | PB (%) | FDN (%) | DVIMS (%) | Leite Estimado pela PB | |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | (kg T ¹ MS) | (kg ha ¹) |
| CENTEIO | TEMPRANO | 23 | 59 | 72 | 2.333 | 16.013 |
| Aveia Preta | Iapar 61 | 22 | 58 | 73 | 2.168 | 15.522 |
| Aveia Branca | IPR 126 | 21 | 59 | 72 | 2.040 | 14.855 |
| Azevém | F ABC 1 | 16 | 64 | 67 | 1.234 | 13.270 |
| Centeio | BRS Serrano | 21 | 59 | 71 | 2.001 | 11.991 |
| Centeio | IPR 89 | 21 | 58 | 68 | 2.032 | 8.307 |

PB - Proteína bruta | FDN - Fibra insolúvel em detergente neutro
DVIMS - Digestibilidade "in vitro" de matéria seca

Fonte: Fundação ABC, 2013.



PRODUTIVIDADE DE LEITE (KG.HA¹) DE CEREAIS DE INVERNO, TOTAL DE 3 CORTES. PONTA GROSSA/PR



Fonte: Fundação ABC, 2015.

Centeio Forrageiro

TEMPRANO

Para mais informações acesse nufarm.com.br